

QUIZ VIH ET IST	VRAI	FAUX
1/ Le VIH est responsable d'une maladie :		
a) Qui se transmet par les rapports sexuels		
b) Qui peut être silencieuse très longtemps		
c) Que l'on peut guérir		
d) Mortelle		
e) Pour laquelle on a un vaccin		
f) Pour laquelle les traitements ont fait de grands progrès ces dernières années		
g) Le traitement doit être pris à vie		
2/ En France, en moyenne, un jeune de 15 à 24 ans est contaminé par le VIH toutes les douze heures		
3/ On peut être porteur du VIH (contaminé) sans le savoir		
4/ On peut être contaminé par le VIH :		
a) En embrassant quelqu'un		
b) En ayant un rapport sexuel non protégé (vaginal ou anal)		
c) En se faisant piquer par un moustique		
d) Lors d'un rapport bouche/sexe		
e) En buvant dans le verre de quelqu'un d'autre		
f) En touchant du sang contaminé		
g) En partageant du matériel d'injection lors de l'usage de drogues		
h) lors de la grossesse (transmission de la mère à l'enfant)		
i) lors de l'allaitement		
j) en s'asseyant sur des toilettes publiques		
5/ La meilleure façon de se protéger du VIH c'est de...		
a) prendre la pilule		
b) utiliser un préservatif masculin ou féminin		
c) superposer deux préservatifs		
d) utiliser un spermicide		

QUIZ VIH ET IST	VRAI	FAUX
1/ Le VIH est responsable d'une maladie :		
a) Qui se transmet par les rapports sexuels		
b) Qui peut être silencieuse très longtemps		
c) Que l'on peut guérir		
d) Mortelle		
e) Pour laquelle on a un vaccin		
f) Pour laquelle les traitements ont fait de grands progrès ces dernières années		
g) Le traitement doit être pris à vie		
2/ En France, en moyenne, un jeune de 15 à 24 ans est contaminé par le VIH toutes les douze heures		
3/ On peut être porteur du VIH (contaminé) sans le savoir		
4/ On peut être contaminé par le VIH :		
a) En embrassant quelqu'un		
b) En ayant un rapport sexuel non protégé (vaginal ou anal)		
c) En se faisant piquer par un moustique		
d) Lors d'un rapport bouche/sexe		
e) En buvant dans le verre de quelqu'un d'autre		
f) En touchant du sang contaminé		
g) En partageant du matériel d'injection lors de l'usage de drogues		
h) lors de la grossesse (transmission de la mère à l'enfant)		
i) lors de l'allaitement		
j) en s'asseyant sur des toilettes publiques		
5/ La meilleure façon de se protéger du VIH c'est de...		
a) prendre la pilule		
b) utiliser un préservatif masculin ou féminin		
c) superposer deux préservatifs		
d) utiliser un spermicide		

	VRAI	FAUX
e) se retirer avant l'éjaculation		
f) avoir un(e) partenaire dont on est sûr		
g) avoir un(e) partenaire qui n'a aucun signe de la maladie		
6/ Lorsqu'on pense avoir pris un risque :		
a) On attend d'être malade		
b) On se lave à l'eau très chaude pour éliminer le virus		
c) On propose à son partenaire de faire le test ensemble le plus rapidement possible		
d) On se rend dans un hôpital le plus rapidement possible et sous 48h pour évaluer la possibilité de prendre un traitement d'urgence		
7/ On peut faire une prise de sang, pour être certain de ne pas avoir le VIH		
a) À partir du 1er jour après un rapport		
b) À partir de 6 semaines (1 mois ½) après un rapport		
c) À partir de 3 mois après un rapport		
8/ On peut faire un test du VIH ?		
a) Dans un laboratoire d'analyses avec une ordonnance		
b) Dans un centre de dépistage gratuit « CeGIDD »		
c) Dans une association de lutte contre le SIDA		
d) Chez soi		
9/ Les infections suivantes sont des infections sexuellement transmissibles		
a) La syphilis		
b) La Chlamydiae		
c) L'herpès génital		
d) La gonococcie		
e) Le condylome		
f) Le VIH		
g) L'hépatite B		

	VRAI	FAUX
e) se retirer avant l'éjaculation		
f) avoir un(e) partenaire dont on est sûr		
g) avoir un(e) partenaire qui n'a aucun signe de la maladie		
6/ Lorsqu'on pense avoir pris un risque :		
a) On attend d'être malade		
b) On se lave à l'eau très chaude pour éliminer le virus		
c) On propose à son partenaire de faire le test ensemble le plus rapidement possible		
d) On se rend dans un hôpital le plus rapidement possible et sous 48h pour évaluer la possibilité de prendre un traitement d'urgence		
7/ On peut faire une prise de sang, pour être certain de ne pas avoir le VIH		
a) À partir du 1er jour après un rapport		
b) À partir de 6 semaines (1 mois ½) après un rapport		
c) À partir de 3 mois après un rapport		
8/ On peut faire un test du VIH ?		
a) Dans un laboratoire d'analyses avec une ordonnance		
b) Dans un centre de dépistage gratuit « CeGIDD »		
c) Dans une association de lutte contre le SIDA		
d) Chez soi		
9/ Les infections suivantes sont des infections sexuellement transmissibles		
a) La syphilis		
b) La Chlamydiae		
c) L'herpès génital		
d) La gonococcie		
e) Le condylome		
f) Le VIH		
g) L'hépatite B		